


Etat des lieux des phénomènes liés aux drogues et aux dépendances en Corrèze - année 2010 -



Sommaire


Consommations de produits psychoactifs chez les jeunes.....	p. 3-32
Tabac.....	p. 3-7
Alcool.....	p.8-19
Cannabis.....	p. 20-23
Médicaments psychotropes.....	p. 24-26
Produits dopants.....	p. 26
Autres produits psychoactifs.....	p. 27-32
Consommations de produits psychoactifs en population générale.....	p. 33-39
Tabac.....	p. 33-34
Alcool.....	p. 35-37
Cannabis.....	p. 38-39
Traitements de substitution aux opiacés.....	p. 40-43
Le Subutex.....	p. 40
La Méthadone.....	p. 41
Derniers chiffres 2009.....	p. 42-43
Politique de réduction des risques.....	p. 44
Ventes de Stéribox.....	p. 44
Conséquences socio sanitaires liées à la consommation de produits Psychoactifs.....	p. 45-47
Décès liés au tabac.....	p. 45
Décès liés à l'alcool.....	p. 46
Alcool et accidents de la route.....	p. 47
Lutte contre le trafic et infractions à la législation sur les stupéfiants.....	p. 48-51
Saisies de produits stupéfiants.....	p. 48
Interpellations.....	p. 49-51

Consommations de produits psychoactifs chez les jeunes

TABAC

Usages à 17 ans


Evolution de l'expérimentation de tabac à 17 ans de 2000-2001 à 2008



En 2008, près de $\frac{3}{4}$ des jeunes Limousins ont fumé au moins une cigarette au cours de leur vie sur la tranche d'âge concernée, ce qui les place au-dessus de la moyenne nationale. Cependant on peut observer une stagnation depuis 2005.

Source : OFDT, ESCAPAD 2000/2001 ; 2002/2003 ; 2005 ; 2008 Exploitation régionale CIRDD Limousin 2010 ; *Expérimentation* = avoir pris au moins une fois du tabac au cours de sa vie

Evolution de l'usage quotidien de tabac à 17 ans de 2000-2001 à 2008



Depuis 2000, le tabagisme quotidien dans la région a diminué. Tendance qui se confirme également au niveau national, notamment chez les filles qui avaient un usage particulièrement élevé.


Source : OFDT, ESCAPAD 2000/2001 ; 2002/2003 ; 2005, Exploitation régionale CIRDD Limousin 2010 ; *Usage quotidien* = avoir pris du tabac au cours des 30 derniers jours précédant l'enquête

**Usage quotidien* de tabac à 17 ans
Année 2008
(Filles et Garçons)**

Moyenne nationale : 28,9 %

**consommation de tabac au moins 1 fois/jour*

Source : OFDT, ESCAPAD 2008, Exploitation régionale
CIRDD Limousin 2010



Usage de tabac



On observe en limousin, une baisse du tabagisme entre 2005 et 2008, cette tendance régionale se révélant comparable à celle observée nationalement. A noter également, une diminution significative de la consommation quotidienne de tabac entre ces périodes avec un phénomène 2 fois plus marqué en Limousin.

Depuis 2000, les jeunes filles limousines sont 2 fois moins nombreuses à déclarer un usage quotidien de tabac, passant de 47% à 25% (les garçons : de 40% à 31%).



Zoom : nouvelles données

Source : extrait de l'Exploitation Régionale de l'enquête Escapad 2008 de l'OFDT, CIRDD Limousin, 2010.

Usage intensif de tabac – Garçons – 2008 (au moins 10 cigarettes par jour)



Usage intensif de tabac – Filles – 2008 (au moins 10 cigarettes par jour)




Consommations de produits psychoactifs chez les jeunes

TABAC

Usages de 13 à 17 ans chez les ados scolarisés


Consommation de tabac chez les adolescents scolarisés en Limousin en 2007



Source : ORS Limousin. Regards sur la santé des collégiens et lycéens du Limousin. Extrait du rapport mai 2009

Ces données sont issues de l'enquête santé, menée en 2007 par l'Observatoire Régional de la Santé auprès des jeunes scolarisés en Limousin. Elle révèle qu'à 13-14 ans, près de 30% des jeunes ont expérimenté le tabac, les filles un peu plus que les garçons ; l'usage quotidien étant peu répandu à cet âge (moins de 3%). A 15-16 ans, ils sont un peu plus de la moitié à l'avoir expérimenté, parmi eux, 16 % en consomme quotidiennement. A partir de 17 ans, ils sont deux tiers à déclarer avoir déjà consommé du tabac. L'usage quotidien concerne alors 29,2% des garçons et 22,7% des filles.

Consommation de tabac chez les adolescents scolarisés en Limousin en 2007



En Corrèze, plus des 2/3 des jeunes scolarisés de 17 ans ou + ont expérimenté le tabac. Parmi eux, 45% sont des fumeurs quotidiens.


Source : ORS Limousin. Regards sur la santé des collégiens et lycéens du Limousin. Extrait du rapport mai 2009

Consommations de produits psychoactifs chez les jeunes

TABAC

Usages chez les étudiants

Consommation excessive de tabac



Cette enquête a concerné 1 032 étudiants de 1^{ère} année de l'Université de Limoges. Ils ont une moyenne d'âge de 19 ans.

11 % des étudiants pensent avoir une consommation excessive de tabac, les garçons un peu plus que les filles.

Source : Enquête Etudiants – Santé – Prévention ; SUMPSS / CIRDD Limousin ; Année scolaire 2007/2008.

La diminution de la consommation de tabac chez les jeunes s'observe sur l'ensemble du territoire. Elle s'explique par une lutte intensive qui agit sur plusieurs leviers :


- restriction des espaces fumeurs (interdiction de fumer dans les entreprises, les lieux d'accueil du public, les restaurants, les débits de boissons, les boites de nuit...),
- augmentation régulière du prix du tabac,
- actions de prévention ciblées surtout vers un public jeune.

Consommations de produits psychoactifs chez les jeunes

ALCOOL

Usages à 17 ans


Evolution de l'usage d'alcool au cours du mois à 17 ans de 2000-2001 à 2008



L'usage d'alcool au cours du mois tend à baisser depuis 2002. Cette baisse est plus marquée en Limousin, particulièrement chez les filles qui avaient des niveaux d'usages très supérieurs par rapport aux autres régions.

Source : OFDT, ESCAPAD 2002/2003 ; 2005 ; 2008, Exploitation régionale CIRDD Limousin 2010 ; Usage d'alcool au cours du mois = usage au cours des trente derniers jours

Evolution de l'usage régulier d'alcool à 17 ans de 2000-2001 à 2008



La baisse de l'usage régulier d'alcool amorcée en 2002 se poursuit. Ce comportement d'usage concerne 4 fois plus les garçons que les filles.


Source : OFDT, ESCAPAD 2000/2001 ; 2002/2003 ; 2005 ; 2008, Exploitation régionale CIRDD Limousin 2010 ; Usage d'alcool au cours du mois = usage au cours des trente derniers jours

Usage régulier*d'alcool à 17 ans Année 2008

Moyenne nationale : 8,9 %

**L'usage régulier désigne le fait d'avoir pris au moins 10 fois de l'alcool au cours des 30 derniers jours précédant l'enquête*

Source : OFDT, ESCAPAD 2008, Exploitation régionale
CIRDD Limousin 2010



Usage régulier d'alcool

Sur l'ensemble du territoire, il est observé une diminution significative de l'usage régulier d'alcool entre 2005 et 2008, atteignant les niveaux enregistrés en 2000 (début de l'enquête ESCAPAD). La même tendance est observée chez les 2 sexes en Limousin, les garçons se situant au-dessus de la moyenne nationale (+ 3,4 pts).



Un phénomène inquiétant : les usages d'alcool ponctuels sévères

Les manières de consommer de l'alcool ont considérablement changé, chez les jeunes, ces dernières années avec l'arrivée en France du phénomène anglo-saxon de « binge drinking ». Au regard des indicateurs recherchés, la région Limousin ne s'écarte pas des tendances nationales. Un jeune limousin sur deux déclare boire 6 verres ou plus en une seule occasion au moins une fois dans le mois (les garçons : 59% et les filles : 40%). Ils sont un sur cinq à déclarer ce comportement au moins 3 fois dans le mois.



Zoom : nouvelles données

Source : extrait de l'Exploitation Régionale de l'enquête Escapad 2008 de l'OFDT, CIRDD Limousin, 2010.

Episodes répétés d'usage d'alcool ponctuel sévère – Garçons – 2008 (6 verres ou + au moins 1 fois par mois)





Episodes répétés d'usage d'alcool ponctuel sévère – Filles – 2008 (6 verres ou + au moins 1 fois par mois)





Zoom : nouvelles données

Source : extrait de l'Exploitation Régionale de l'enquête Escapad 2008 de l'OFDT, CIRDD Limousin, 2010.

Episodes répétés d'usage d'alcool ponctuel sévère – Garçons – 2008 (6 verres ou + au moins 3 fois par mois)




Episodes répétés d'usage d'alcool ponctuel sévère – Filles – 2008 (6 verres ou + au moins 3 fois par mois)




Zoom : nouvelles données

Source : extrait de l'Exploitation Régionale de l'enquête Escapad 2008 de l'OFDT, CIRDD Limousin, 2010.

Episodes répétés d'usage d'alcool ponctuel sévère – Garçons – 2008 (6 verres ou + au moins 10 fois par mois)



Episodes répétés d'usage d'alcool ponctuel sévère – Filles – 2008 (6 verres ou + au moins 10 fois par mois)




Consommations de produits psychoactifs chez les jeunes

ALCOOL

Usages de 13 à 17 ans chez les ados scolarisés


A 13-14 ans, l'usage d'alcool au cours du mois et l'usage régulier ne diffèrent pas entre les deux sexes. Avec l'âge, l'écart se creuse entre les filles et les garçons, ces derniers étant 5 fois plus nombreux à déclarer un usage régulier à 15-16 ans. A 17 ans et +, près de 3 garçons sur 10 ont consommé au moins 10 fois de l'alcool dans le mois.

Usage d'alcool chez les adolescents scolarisés en
Limousin en 2007



Source : ORS Limousin. Regards sur la santé des collégiens et lycéens du Limousin. Extrait du rapport mai 2009

Usage d'alcool chez les adolescents scolarisés en Limousin
(4^{ème}, 2^{nde} et terminale)




Plus de 80% des adolescents scolarisés en Corrèze ont expérimenté l'alcool, les filles un peu moins que les garçons. La consommation régulière est quant à elle plus masculine (15,5% vs 2,8%). Les jeunes garçons corréziens semblent davantage consommer régulièrement de l'alcool que leurs homologues limousins. Les corréziennes à l'inverse sont moins consommatrices à ce niveau d'usage.

Source : ORS Limousin. Regards sur la santé des collégiens et lycéens du Limousin. Extrait du rapport mai 2009

Consommations de produits psychoactifs chez les jeunes

ALCOOL


Usages chez les étudiants



Près de 3 garçons sur 10 consomment de l'alcool seuls de manière régulière ou occasionnelle, les filles sont 16,9 % à déclarer boire en solitaire.


Ce comportement d'alcoolisation solitaire est un signe qui doit alerter sur des consommations problématiques futures.

Source : Enquête Etudiants – Santé – Prévention ; SUMPSS / CIRDD Limousin ; Année scolaire 2007/2008.



Sur la base de critères précis de consommation excessive d'alcool, les garçons sont 4 fois plus nombreux que les filles à développer ce type de comportement. Ils sont 2 sur 5 à consommer en excès, régulièrement ou occasionnellement.


Source : Enquête Etudiants – Santé – Prévention ; SUMPSS / CIRDD Limousin ; Année scolaire 2007/2008.



Les étudiants participent régulièrement à des soirées, soit dans des établissements de nuit (restaurants, discothèques, bars) soit au domicile de l'un d'entre eux. Elles sont la plupart du temps accompagnées d'alcool. Les consommations sont alors très importantes puisque 2 garçons sur 5 déclarent boire régulièrement plus de 5 verres par soirée et plus des 2/3 de manière régulière ou occasionnelle.

Source : Enquête Etudiants – Santé – Prévention ; SUMPSS / CIRDD Limousin ; Année scolaire 2007/2008.

Perte de mémoire après une soirée arrosée



1/3 des étudiants déclarent qu'il leur arrive (régulièrement ou occasionnellement) de boire et de ne plus se souvenir le matin de ce qu'ils ont pu dire ou faire. Ce comportement est plutôt masculin (37,7 %) que féminin (25,1 %) et s'apparente au phénomène de « binge drinking » qui est observé sur le territoire depuis quelques années.


Source : Enquête Etudiants – Santé – Prévention ; SUMPSS / CIRDD Limousin ; Année scolaire 2007/2008.

Consommations de produits psychoactifs chez les jeunes

ALCOOL

Ivresses à 17 ans

Evolution de l'ivresse au cours de la vie à 17 ans de 2000-2001 à 2008




L'ivresse au cours de la vie concerne plus de la moitié des jeunes de 17 ans. Ils sont près de 7 garçons sur 10 en Limousin à déclarer avoir connu l'ivresse.

Les niveaux d'usage des filles limousines (qui se singularisaient par des déclarations d'ivresses supérieures à la moyenne nationale depuis 2002-2003) se stabilisent, réduisant ainsi les écarts avec le reste de la France dont la tendance est à l'augmentation.

Source : OFDT, ESCAPAD 2000/2001 ; 2002/2003 ; 2005 ; 2008, Exploitation régionale CIRDD Limousin 2010 ; *Ivresse au cours de la vie = avoir été ivre au moins une fois dans sa vie*

Evolution des ivresses répétées à 17 ans de 2002-2003 à 2008




Chez les garçons, plus d'un jeune sur 3 déclare des ivresses répétées (contre 1 fille sur 5). En Limousin, l'évolution la plus significative concerne les filles qui enregistrent une augmentation de 10 points entre 2000/2001 et 2008 (contre 6 points chez les garçons).

Source : OFDT, ESCAPAD 2000/2001 ; 2002/2003 ; 2005 ; 2008, Exploitation régionale CIRDD Limousin 2010 ; *Usage excessif d'alcool = au moins 3 ivresses au cours de l'année*

**En 2008, ivresses répétées*
d'alcool à 17 ans (filles et garçons)**
Moyenne nationale : 25,6 %

* *Usage excessif d'alcool = au moins 3 ivresses au cours
de l'année*

Source : OFDT, ESCAPAD 2008, Exploitation régionale
CIRDD Limousin 2010



Ivresses


Globalement, les jeunes limousins déclarent plus souvent des ivresses que leurs homologues métropolitains, situant notre région au-dessus de la moyenne nationale, sans que pour autant cette différence soit significative. Une exception cependant, pour les ivresses répétées (au moins 3 fois dans l'année) des garçons limousins, qui est le seul indicateur en dessous.

Dans tous les indicateurs d'ivresses, on observe en 2008, une relative stabilité par rapport à 2005. On peut retenir qu'un adolescent sur deux de 17 ans a connu un épisode d'ivresse dans l'année (garçons : 53% ; filles : 45%).


Zoom : nouvelles données

Source : extrait de l'Exploitation Régionale de l'enquête Escapad 2008 de l'OFDT, CIRDD Limousin, 2010.

Ivresses régulières – Garçons – 2008 (au moins 10 fois dans l'année)



Ivresses régulières – Filles – 2008 (au moins 10 fois dans l'année)




Consommations de produits psychoactifs chez les jeunes

ALCOOL

Ivresses de 13 à 17 ans chez les ados scolarisés


Fréquence des ivresses chez les adolescents scolarisés en Limousin en 2007



Les fréquences d'ivresses augmentent fortement avec l'âge. A 13-14 ans les niveaux d'usages sont sensiblement identiques chez les filles et chez les garçons mais ensuite les écarts se creusent entre les 2 sexes. A 17 ans et +, la moitié des garçons et un quart des filles ont déclaré avoir été ivres au moins 3 fois dans l'année.

Source : ORS Limousin. Regards sur la santé des collégiens et lycéens du Limousin. Extrait du rapport mai 2009

Déclarations d'ivresses chez les adolescents scolarisés en Limousin - (4^{ème}, 2^{nde} et terminale)



Les jeunes corréziens se situent dans la moyenne régionale aussi bien pour l'expérimentation de l'ivresse que pour les ivresses régulières. A noter cependant que les garçons sont 13,6% à déclarer des ivresses régulières (10 fois au cours des 12 derniers mois) contre 3,4% chez les filles.


Source : ORS Limousin. Regards sur la santé des collégiens et lycéens du Limousin. Extrait du rapport mai 2009

Consommations de produits psychoactifs chez les jeunes

CANNABIS

Usages à 17 ans


Evolution de l'expérimentation de cannabis à 17 ans de 2000-2001 à 2008



Depuis 2002/2003, le niveau d'expérimentation baisse régulièrement aussi bien chez les filles que chez les garçons, en Limousin comme sur le reste du territoire. Dans notre région, les niveaux d'usages sont significativement moins élevés pour les 2 sexes.

Source : OFDT, ESCAPAD 2002/2003 ; 2005 ; 2008, Exploitation régionale CIRDD Limousin 2010 ;
Expérimentation = avoir pris au moins 1 fois du cannabis au cours de sa vie

Evolution de l'usage régulier de cannabis à 17 ans de 2000-2001 à 2008



L'usage régulier de cannabis est en constante diminution depuis 2002-2003 en Limousin, comme sur le reste du territoire. De plus, les écarts observés jusqu' alors entre le Limousin et la France métropolitaine se réduisent. Cette tendance est plus marquée chez les garçons. Les filles limousines ne sont plus que 1% en 2008 à déclarer des consommations régulières alors qu'elles étaient 5% en 2005.

Source : OFDT, ESCAPAD 2002/2003 ; 2005 ; 2008 Exploitation régionale CIRDD Limousin 2010 ;
Usage régulier = avoir consommé au moins 10 fois du cannabis dans le mois



Usage de cannabis

En Limousin, comme ailleurs, le niveau de consommation de cannabis chez les jeunes poursuit la baisse amorcée en 2003, atteignant les niveaux les plus bas enregistrés depuis le début de l'enquête (2000). Quels que soient les indicateurs recherchés, la région Limousin se situe en dessous des moyennes nationales.



Zoom : nouvelles données

Source : extrait de l'Exploitation Régionale de l'enquête Escapad 2008 de l'OFDT, CIRDD Limousin, 2010.

Usage régulier de cannabis – Garçons – 2008 (au moins 10 fois dans le mois)



Usage régulier de cannabis – Filles – 2008 (au moins 10 fois dans le mois)



Consommations de produits psychoactifs chez les jeunes


CANNABIS

Usages de 13 à 17 ans chez les ados scolarisés

Avant 17 ans, l'expérimentation de cannabis se révèle être de même niveau chez les filles que chez les garçons. L'usage quotidien est très peu répandu dans cette tranche d'âge.


A 17 ans ou +, les comportements diffèrent singulièrement entre les filles et les garçons, que ce soit pour l'expérimentation (38,1% vs 48,4%) ou pour l'usage quotidien. Un garçon sur 10 déclare consommer au moins 10 fois dans le mois du cannabis alors que les filles ne sont que 2%.

Consommation de cannabis chez les adolescents scolarisés en Limousin en 2007



Source : ORS Limousin. Regards sur la santé des collégiens et lycéens du Limousin. Extrait du rapport mai 2009

Usage de cannabis chez les adolescents scolarisés en Limousin en 2007



En Corrèze, l'usage régulier de cannabis est moins répandu (aussi bien chez les garçons que chez les filles), que dans le reste de la région.

Les filles sont également nettement moins expérimentatrices que leurs homologues limousines. Les garçons quant à eux se situent dans la moyenne régionale.


Source : ORS Limousin. Regards sur la santé des collégiens et lycéens du Limousin. Extrait du rapport mai 2009 -

Consommations de produits psychoactifs chez les jeunes

CANNABIS

Usages chez les étudiants

Consommation quotidienne de cannabis



La consommation quotidienne de cannabis est peu répandue, elle concerne 2 fois plus les garçons que les filles. Cependant, dans certaines périodes (non précisées dans l'enquête), elle s'avère importante, notamment chez les garçons (10,6 %).


Source : Enquête Etudiants – Santé – Prévention ; SUMPSS / CIRDD Limousin ; Année scolaire 2007/2008.

Consommations de produits psychoactifs chez les jeunes

MEDICAMENTS PSYCHOTROPES

Usages à 17 ans

Expérimentation de somnifères à 17 ans : filles et garçons




Moyenne nationale garçons : 12,1 %
Moyenne nationale filles : 17,1 %

Contrairement aux autres produits psychoactifs, ce sont les jeunes filles qui sont les plus consommatrices de médicaments psychotropes. En Limousin 1 fille sur 5 déclare avoir déjà pris un somnifère.

Source : OFDT, ESCAPAD 2002/2003 ; 2005 ; 2008 Exploitation régionale CIRDD Limousin 2010 ;
Expérimentation = avoir pris au moins 1 fois des médicaments psychotropes au cours de sa vie.

Expérimentation de tranquillisants à 17 ans : filles et garçons




Moyenne nationale garçons : 13,9 %
Moyenne nationale filles : 23,1 %

Le Limousin se démarque nettement du reste de la France par l'expérimentation de tranquillisants à 17 ans. Aussi bien chez les filles que chez les garçons, notre région occupe le 1^{er} rang national.

Source : OFDT, ESCAPAD 2002/2003 ; 2005 ; 2008 Exploitation régionale CIRDD Limousin 2010 ;
Expérimentation = avoir pris au moins 1 fois des médicaments psychotropes au cours de sa vie

Expérimentation d'antidépresseurs à 17 ans : filles et garçons



Moyenne nationale garçons : 4,8 %
Moyenne nationale filles : 9,6%

Dans la catégorie des médicaments psychotropes, les antidépresseurs sont les moins expérimentés dans la tranche d'âge concernée. Le Limousin est une fois de plus davantage expérimentateur, les filles 2 fois plus que les garçons (cette proportion est observée également au niveau national).

Source : OFDT, ESCAPAD 2002/2003 ; 2005 ; 2008 Exploitation régionale CIRDD Limousin 2010 ;
Expérimentation = avoir pris au moins 1 fois des médicaments psychotropes au cours de sa vie

Expérimentation de médicaments psychoactifs

Pour la première fois depuis son lancement, l'étude ESCAPAD interroge les jeunes sur leurs consommations de médicaments psychoactifs.

Concernant l'expérimentation de ces médicaments, le Limousin occupe les premiers rangs des régions avec des tendances féminines largement marquées. Une précaution de lecture cependant : les médicaments psychoactifs sont utilisés dans le cadre de traitements, ce qui signifie que bien souvent la première expérimentation introduit un usage thérapeutique et médical au long terme. L'étude ne permet pas de distinguer si les consommations font suite à des traitements médicaux ou non.

- Pour les **tranquillisants**, la région est au 1^{er} rang : 18% des garçons et 28% des filles, avec des moyennes nationales à 13.9% pour les garçons et 23.1% pour les filles.
- Pour les **somnifères**, la région est au 2nd rang derrière la Haute-Normandie: les filles à 20% supplantent largement les garçons avec 12% contre des moyennes nationales à 17,1% pour les filles et 12,1% pour les garçons.
- Pour les **antidépresseurs**, la région est encore au 1^{er} rang : les filles avec 13% et les garçons avec 7% contre des moyennes nationales à 9.6% pour les filles et 4.8% pour les garçons.


Ces chiffres inquiétants indiquent un mal être certain chez les jeunes, qui en ont pris conscience et qui essayent de soulager leurs maux par l'absorption de médicaments. Lorsque ceux-ci sont pris dans le cadre d'une prise en charge médicale, les jeunes bénéficient de la compétence de professionnels, mais lorsqu'il s'agit d'automédication, ils s'exposent à des risques majeurs.

Consommations de produits psychoactifs chez les jeunes

MEDICAMENTS PSYCHOTROPES

Chez les étudiants

Consommation de médicaments hors prescription



Il convient de souligner que l'enquête ne précise pas s'il s'agit de médicaments psychoactifs. Cependant, comme il a été observé dans plusieurs enquêtes (locales, régionales, nationales), la consommation de médicaments psychoactifs reste élevée particulièrement dans notre région.

Source : Enquête Etudiants – Santé – Prévention ; SUMPSS / CIRDD Limousin ; Année scolaire 2007/2008.

Consommations de produits psychoactifs chez les jeunes

PRODUITS DOPANTS

Chez les jeunes

Jeunes limousins déclarant avoir consommé au moins une fois des produits dopants ou stimulants en 2007/2008

	Collégiens		Lycéens		Etudiants 1ère année		Etudiants kiné		Etudiants sport	
	G	F	G	F	G	F	G	F	G	F
Produits dopants	2,4%	3,2%	7,2%	6,2%	11,0%	4,0%	14,3%	6,9%	15,2%	18,6%
Produits psychostimulants	nd	nd	nd	nd	9,9%	8,6%	17,1%	23,9%	4,5%	2,7%

Source : ORS Limousin Enquête scolaire 2007 – ORS Limousin, SUMPSS et CIRDD 2008


L'expérimentation des produits dopants ou stimulants s'avère peu répandue en Limousin dans la population scolarisée. Les filières spécifiques (Ex : STAPS, pôles espoirs) bénéficient systématiquement d'une sensibilisation à cette thématique et des contrôles inopinés sont diligentés chaque année, prioritairement dans les championnats nationaux.

Consommations de produits psychoactifs chez les jeunes

COCAINE

Usages à 17 ans

Evolution de l'expérimentation de cocaïne à 17 ans de 2002-2003 à 2008



Source : OFDT, ESCAPAD 2002/2003 ; 2005 ; 2008, Exploitation régionale CIRDD Limousin 2010

En Limousin comme ailleurs, la consommation de cocaïne reste marginale avant 17 ans. Depuis 2002-2003, on enregistre une augmentation régulière de l'expérimentation de cocaïne. Cette tendance diffère en Limousin, mais il s'agit de rester prudent sur les interprétations car les échantillons interrogés sont faibles.

Expérimentation de cocaïne


L'expérimentation de la cocaïne en Limousin se distingue par son originalité. En effet, on y observe une tendance nettement féminine : 4% des filles contre 2% de garçons. L'écart est significatif puisque le Limousin atteint le 3^{ème} rang pour l'expérimentation chez les filles, alors que la région reste à l'avant dernière place chez les garçons.

Consommations de produits psychoactifs chez les jeunes

HEROÏNE

Usages à 17 ans

Evolution de l'expérimentation d'héroïne à 17 ans
de 2002-2003 à 2008



Moins de 1% des jeunes de 17 ans ont expérimenté l'héroïne. Compte tenu de la taille de l'échantillon et de ces indicateurs très faibles, il n'est pas possible d'en faire l'analyse.

Source : OFDT, ESCAPAD 2002/2003 ; 2005 ; 2008, Exploitation régionale CIRDD Limousin 2010

Expérimentation d'héroïne

La consommation d'héroïne est plutôt observée dans une population masculine de plus de 30 ans.


Peu de jeunes sont donc concernés par ces produits et ceux qui les ont expérimentés sont très à la marge de la société.

Consommations de produits psychoactifs chez les jeunes

CHAMPIGNONS HALLUCCINOGENES

Usages à 17 ans

Evolution de l'expérimentation de champignons hallucinogènes à 17 ans de 2002-2003 à 2008




L'expérimentation de champignons hallucinogènes a baissé en Limousin aussi bien chez les garçons que chez les filles, alors que sur le reste du territoire, on observe plutôt une stagnation.

Source : OFDT, ESCAPAD 2002/2003 ; 2005 ; 2008, Exploitation régionale CIRDD Limousin 2010

Consommations de produits psychoactifs chez les jeunes

ECSTASY

Usages à 17 ans




L'expérimentation d'ecstasy reste faible chez les jeunes limousins de 17 ans. Elle concerne 3% des garçons et seulement 1% des filles. Les niveaux enregistrés en 2008 sont les mêmes qu'en 2005, alors qu'à l'échelle nationale on observe une légère diminution.

Source : OFDT, ESCAPAD 2002/2003 ; 2005 ; 2008, Exploitation régionale CIRDD Limousin 2010

Consommations de produits psychoactifs chez les jeunes

POPPERS

Usages à 17 ans



L'expérimentation de poppers est marquée par une forte hausse en 2008. En limousin, 1 fille sur 10 dit avoir expérimenté le produit et 1 garçon sur 5. Ce phénomène est national.

Source : OFDT, ESCAPAD 2002/2003 ; 2005 ; 2008, Exploitation régionale CIRDD Limousin 2010

Expérimentation de poppers

Il s'agit du produit psychoactif qui a subi la plus forte augmentation d'expérimentation chez les jeunes entre 2005 et 2008. Le Limousin n'échappe pas à cette tendance. Depuis 2002, les garçons sont 2 fois plus nombreux et les filles 4 fois plus nombreuses à déclarer un usage de poppers.

Rappelons que ce phénomène était attendu, notamment en raison de la facilité d'accès au produit, de son prix attractif (10 à 15€ les 10 ml) et de ses effets courts qui correspondent aux modes de vie de la catégorie d'âge observée (adolescents).


Le Limousin, qui se singularisait depuis 2002 en étant une des premières régions consommatrice, ne se démarque plus en 2008, même si les niveaux de consommation ont augmenté.

Consommations de produits psychoactifs chez les jeunes


AUTRES PRODUITS

Usages à 17 ans

Garçons - Evolution de l'expérimentation d'autres produits à 17 ans de 2005 à 2008



Filles - Evolution de l'expérimentation d'autres produits à 17 ans de 2005 à 2008



L'expérimentation d'autres produits psychoactifs à 17 ans reste quant à elle très faible, comme les amphétamines ou le LSD. En revanche, les pratiques autour des produits à inhaler restent en légère augmentation, phénomène particulièrement visible chez les filles.

Source : OFDT, ESCAPAD 2002/2003 ; 2005 ; 2008, Exploitation régionale CIRDD Limousin 2010

Expérimentation « autres produits »


- L'expérimentation des **champignons hallucinogènes** a baissé en Limousin aussi bien chez les garçons que chez les filles, alors que sur le reste du territoire, on observe plutôt une stagnation.
- L'expérimentation de **produits à inhaler**, semble quant à elle augmenter aussi bien en Limousin qu'ailleurs. Il s'agit de produits faciles d'accès, dont les effets sont courts et le prix très abordable. Ce sont les raisons pour lesquelles, les jeunes, avides de nouvelles sensations, n'hésitent pas à tenter l'expérience.
- L'expérimentation d'**amphétamines** concerne en Limousin aussi bien les garçons que les filles (3%) alors qu'en métropole, les garçons sont plus consommateurs (3,5% contre 1,9%).
- En Limousin, l'expérimentation de **LSD** est anecdotique et en France, seulement 1,2% des jeunes sont concernés.

Consommations de produits psychoactifs en population générale

TABAC

Population générale

Evolution des ventes de cigarettes par habitants (tous âges) de 2002 à 2008



Source : OFDT, ILIAD (Indicateurs Locaux pour l'Information sur les Addictions)

Depuis 2002 en France, on observe une baisse constante des ventes de cigarettes par habitant, celle-ci ayant été plus marquée entre 2002 et 2003. Cette tendance est confirmée en Corrèze jusqu'en 2004, mais de 2005 à 2008 c'est plutôt une stabilité qui s'installe, plaçant le département légèrement au-dessus de la moyenne nationale.

Les augmentations successives du prix du tabac, la restriction des lieux fumeurs et un durcissement des messages préventifs ont probablement contribué à favoriser l'arrêt du tabac ou la diminution chez les consommateurs.

Avec plus de 66 000 décès annuels directement ou indirectement imputables à son usage en France (dont les neuf dixièmes pour des hommes), le tabac reste la première cause de mortalité évitable en France. En 2020, ce sera la 3^{ème} cause de mortalité dans le monde si la tendance se poursuit, notamment avec une population féminine qui devient de plus en plus consommatrice régulière.

La France compte 15 millions de fumeurs. Un tiers des personnes de 12 à 75 ans (33 %) fume, ne serait-ce que de temps en temps. Entre 18 et 34 ans, près d'une personne sur deux fume. La prévalence tabagique passe de 9 % pour les 12-14 ans à 41 % pour les 15-19 ans et atteint un maximum de 48 % chez les 20-25 ans.


Source : Tabac Info Service, le tabac en quelques chiffres.

Consommations de produits psychoactifs en population générale

TABAC

Chez les résidents des foyers de jeunes travailleurs

Statut tabagique des résidents des foyers de jeunes travailleurs du Limousin



Source : CIRDD Limousin – Enquête réalisée auprès de 173 résidents de FJT du Limousin

Année 2008

Les hommes sont davantage consommateurs de tabac et les femmes déclarent plus souvent, mais non significativement, être d'anciennes fumeuses.

Les résidents des FJT constituent un public particulier que l'on ne peut pas considérer comme précaire puisque moins de 5 % n'ont pas d'emploi ou de formation. En revanche, ils sont considérés comme vulnérables du fait de l'éloignement familial.

La population est plutôt masculine (2/3 d'hommes pour 1/3 de femmes) et ont une moyenne d'âge de 25 ans. En leur sein, 64,9 % des fumeurs déclarent ressentir une dépendance au tabac et ils sont 53,4 % à envisager d'arrêter de fumer.

Consommations de produits psychoactifs en population générale

ALCOOL

Population générale

Nombre de consommateurs d'alcool venus consulter dans les CCAA


	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Evolution 2007/2008	Evolution 2002/2008
Corrèze	247	nc	346	384	nc*	440	480	9,09%	94,33%
Limousin	1 366	1 446	1 256	1 817	nc	2 147	2 215	3,17%	62,15%
France	95 519	97 906	104 746	121 409	125 955	129 236	137 083	6,07%	43,51%

* données non communiquées

Source : OFDT, ILIAD (Indicateurs Locaux pour l'Information sur les Addictions)

En Corrèze, le nombre de consommateurs d'alcool venus consulter au CCAA a considérablement augmenté entre 2002 et 2008 (plus de 94%). Les injonctions de soins, ordonnées par le Parquet, constituent une part importante des consultations. Cette augmentation est plus de 2 fois supérieure à la tendance nationale.

Evolution du nombre de consommateurs venus consulter dans les CCAA pour 1000 hab de 20 à 70 ans de 2002 à 2008




* Données non communiquées

Source : OFDT, ILIAD (Indicateurs Locaux pour l'Information sur les Addictions)

Le nombre de buveurs venus consulter au CCAA de Corrèze augmente régulièrement depuis 2002, suivant ainsi la tendance nationale, tout en restant en dessous de la moyenne. En 2008, le département occupe le 62^{ème} rang au niveau national (Haute-Vienne, 19^{ème} rang ; Creuse, 12^{ème} rang).


Usage régulier d'alcool parmi les 15-75 ans Année 2005

En 2005, l'usage régulier d'alcool en Limousin est légèrement supérieur à la moyenne nationale sans pour autant être significatif (+ 3,5 points).



Source : OFDT, INPES (Atlas régional des consommations d'alcool 2005)


Usage quotidien d'alcool parmi les 15-75 ans Année 2005



L'usage quotidien d'alcool est un comportement plutôt masculin (3 fois plus que les femmes). En Limousin, cet usage est plus répandu que dans le reste du territoire, plaçant notre région au 4^{ème} rang.

Source : OFDT, INPES (Atlas régional des consommations d'alcool 2005)

Niveaux d'ivresses déclarées parmi les 15-75 ans Année 2005



Source : OFDT, INPES (Atlas régional des consommations d'alcool 2005)

En Limousin, les niveaux d'ivresses alcooliques ne s'écartent pas de la moyenne nationale. L'ivresse est un comportement plutôt masculin, les hommes étant 4 fois plus que les femmes à tous les niveaux d'ivresses.

Usages à risque d'alcool parmi les 15-75 ans (en %)

	Hommes		Femmes		Ensemble	
	Limousin	France	Limousin	France	Limousin	France
6 verres et + en une seule occasion au moins une fois par mois	31	23,5	4	6,1	17	14,6
6 verres et + en une seule occasion au moins une fois par semaine	8	6,8	2	1	5	3,9
Usage à risque chronique ou dépendant	17	14,7	4	2,6	10	8,5
Usage problématique	6	14,3	4	5,1	5	9,7

Source : OFDT, INPES (Atlas régional des consommations d'alcool 2005)

En Limousin, les proportions d'usagers à risque sont supérieures à ce qui est mesuré sur l'ensemble du territoire, sans pour autant être significatives. En revanche, les usages problématiques sont 2 fois moins importants chez les hommes.

Consommations de produits psychoactifs en population générale

CANNABIS

Population générale

Nombre de consommateurs de drogues illicites venus consulter dans les CSST

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Evolution 2007/2008	Evolution 2002/2008
Corrèze	76	98	98*	278	278*	368	463	25,82%	509,21%
Limousin	405	328	328*	734	734*	902	1 193	32,26%	194,57%
France	24 502	32 207	32 207*	88 155	90 790	95 719	100 182	4,66%	308,87%


*Données non communiquées

Source : OFDT, ILIAD (Indicateurs Locaux pour l'Information sur les Addictions)

Les Centres Spécialisés de Soins pour Toxicomanes (CSST) accueillent tout public concerné par des problèmes liés à la consommation de drogues.

On observe une augmentation très importante de la fréquentation dans les CSST depuis 2005, qui s'explique en partie par la mise en place des consultations cannabis...

Au CSST de Brive, l'évolution du nombre de personnes venues consulter entre 2002 et 2008 est nettement supérieure à celle de l'ensemble du territoire puisque la fréquentation a été multipliée par 6 dans cette période contre 4 au niveau national.



Depuis 2002, le nombre de consommateurs (pour 10 000 habitants de 20 à 39 ans) venus consulter au CSST de Brive est en constante augmentation et a été multiplié par 6 durant cette période.

Depuis 2007, la Corrèze se situe très au-dessus de la moyenne nationale et place en 2008 le département au 15^{ème} rang en terme d'accessibilité aux soins.


Consommations de produits psychoactifs en population générale

CANNABIS

Chez les résidents de foyers de jeunes travailleurs

Dans les foyers de jeunes travailleurs, comme ailleurs, le cannabis est le produit psychoactif illicite le plus consommé. En Limousin, 58,9 % des résidents l'ont expérimenté, la 1^{ère} consommation ayant eu lieu en moyenne entre 15 et 16 ans. Parmi eux, 36,4 % continuent de fumer et seulement 30 % souhaitent arrêter.

Expérimentation du cannabis chez les résidents des foyers de jeunes travailleurs du Limousin



Source : CIRDD Limousin – Enquête réalisée auprès de 173 résidents de FJT du Limousin ; Année 2008

Les traitements de substitution aux opiacés

LE SUBUTEX

La dépendance aux opiacés est l'une des rares dépendances aux drogues pour laquelle un traitement pharmacologique de substitution est disponible et efficace.


En France, les deux médicaments utilisés dans le traitement de la dépendance aux opiacés sont le Subutex (et son générique, la Buprénorphine) et la Méthadone.

Alors qu'un traitement par la Méthadone ne peut être initié que dans un centre spécialisé (CSST) ou dans un établissement de soins, le Subutex peut être prescrit par tout médecin.

Vente de Subutex en nombre de boîtes*

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Evolution 2007/2008	Evolution 2002/2008
Corrèze	9 628	10 373	10 653	11 481	11 084	8 129	8 469	4,2%	-12,0%
Limousin	30 233	32 845	34 046	34 433	36 248	28 921	31 920	10,4%	5,6%
France	5 515 935	5 871 619	5 991 042	6 003 020	6 128 444	4 291 641	3 854 847	-10,2%	-30,1%

Evolution des ventes de Subutex pour 100 hab de 20 à 39 ans de 2002 à 2008 (en nombre de boîtes)



Source : OFDT, ILIAD, 2009 (Indicateurs Locaux pour l'Information sur les Addictions)

* Pour éviter de fournir des chiffres pour chacun des conditionnements l'ensemble des quantités vendues est ici exprimé en nombre de boîtes "théoriques" de 7 comprimés dosés à 6 mg jusqu'en 2006 et 8mg depuis 2007. Il ne s'agit pas du nombre de personnes à qui ces traitements ont été prescrits.

La baisse constatée en 2007 s'explique par le comptage différent des boîtes théoriques. En 2008, on observe en Corrèze une très légère augmentation du nombre de ventes de boîtes de Subutex à l'inverse de la France qui poursuit la baisse amorcée en 2006.


Depuis le début de l'enquête, la Corrèze se situe très en dessous de la moyenne nationale plaçant le département au 71^{ème} rang en 2008.

LA METHADONE

Vente de Méthadone en nombre de flacons*

	2004	2005	2006	2007	2008	Evolution 2007/2008	Evolution 2004/2008
Corrèze	2 580	2 907	3 615	4 765	8 636	81,2%	234,7%
Limousin	12 609	18 667	20 107	22 501	30 528	35,7%	142,1%
France	3 947 171	4 624 083	5 554 619	6 699 517	7 546 782	12,6%	91,2%

Evolution des ventes de Méthadone pour 100 hab de 20 à 39 ans de 2004 à 2008
(en nombre de flacons)



Source : OFDT, ILIAD, 2009 (Indicateurs Locaux pour l'Information sur les Addictions)

L'ensemble des quantités vendues est ici exprimé en nombre de flacons "théoriques" de 60 mg. Il ne s'agit pas du nombre de personnes à qui ces traitements ont été prescrits.

Depuis 2004, la vente de Méthadone augmente régulièrement chaque année. Cette tendance s'observe également en Corrèze mais les ventes sont très inférieures à la moyenne nationale, plaçant le département au 89^{ème} rang.

DERNIERS CHIFFRES 2009

Source: URCAM – Union Régionale des Caisses
d'Assurance Maladie

Les données présentées ci-dessous sont produites par l'URCAM et sont relatives aux remboursements des traitements de substitution (pharmacie de ville) en inter-régimes, pour la région Limousin, sur l'année 2009. De ce fait, les chiffres présentés ne tiennent pas compte des délivrances réalisées dans les hôpitaux et le CSAPA.

ZOOM sur les traitements de substitution aux opiacés en Corrèze en 2009 (Subutex* et Méthadone*)

	Subutex			Buprénorphine			Méthadone		
	Hommes	Femmes	Ensemble	Hommes	Femmes	Ensemble	Hommes	Femmes	Ensemble
<u>Bénéficiaires</u>									
Nombre	79	42	121	78	16	94	93	46	139
Age moyen	35 ans	35 ans	35 ans	33 ans	34 ans	33 ans	33 ans	33 ans	33 ans
<u>Quantités délivrées</u>									
Quantité totale*	8 565	1 720	10 285	1 235	108	1 343	6 879	1 884	8 763
Quantité moyenne par personne**	108	41	85	16	7	14	74	41	63
<u>Bases de remboursements</u>									
Remboursement total en €	147 504	29 479	176 983	18 476	2 444	20 920	21 582	7 005	25 586
Remboursement par pers/an en €	1 867	702	1 463	237	153	223	232	152	206

* Le Subutex et la Buprénorphine sont vendus sous différents conditionnements. Pour éviter de fournir des chiffres pour chacun des conditionnements, l'ensemble des quantités vendues est exprimé en nombre de boîtes "théoriques" de 7 comprimés dosés à 6 mg

Pour les mêmes raisons, l'ensemble des quantités de Méthadone vendues est ici exprimé en nombre de flacons "théoriques" de 60 mg et en nombre de gélules "théoriques" de 60mg.

**La quantité moyenne par personne est exprimée en boîtes et flacons théoriques

Chiffres globaux:

Nombre de bénéficiaires **354** dont 250 hommes et 104 femmes

Quantités totales de Subutex et Buprénorphine délivrées en boîtes théoriques de 7 comprimés de 6 mg **Subutex + Buprénorphine : 11 628**

Quantités totales de Méthadone délivrées en flacons et en gélules théoriques de 60 mg **Méthadone : 8 763** dont 1 547 gélules et 7 216 flacons

Montant total des remboursements

Subutex + Buprénorphine : 197 903 €


Méthadone : 25 586 €

Les traitements de substitution concernent plus les hommes que les femmes (250 contre 104) et la moyenne d'âge des bénéficiaires est de 34 ans (aussi bien chez les hommes que chez les femmes). Les traitements par Subutex et Buprénorphine sont plus nombreux que par Méthadone qui est le médicament dont le protocole en termes de prescription et de délivrance est le plus strict. Très souvent, la dispensation a lieu au CSAPA et dans l'unité d'hospitalisation du Centre Hospitalier de Brive, dont les données ne sont pas prises en compte dans ces statistiques.


Nombre de bénéficiaires de traitements de substitution par sexe/âge/produits Corrèze 2009

	Subutex		Buprénorphine		Méthadone		Totaux	
	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
- de 20 ans	2	1	0	0	0	0	2	1
de 20 à 24 ans	9	7	14	1	6	9	29	17
de 25 à 29 ans	13	8	14	5	23	6	50	19
de 30 à 34 ans	15	6	15	2	34	5	64	13
de 35 à 39 ans	12	8	17	4	18	15	47	27
de 40 à 44 ans	11	4	12	1	11	11	34	16
de 45 à 49 ans	8	4	3	2	0	0	11	6
de 50 à 54 ans	8	3	3	1	1	0	12	4
de 54 ans à 59 ans	1	0	0	0	0	0	1	0
60 ans et +	0	1	0	0	0	0	0	1
Totaux	79	42	78	16	93	46	250	104


Répartition des bénéficiaires de traitements de substitution par sexe et âge- Corrèze 2009



Nombre de bénéficiaires de traitements de substitution par sexe – Corrèze 2009



Nombre de bénéficiaires de traitements de substitution en fonction de l'âge - Corrèze 2009



En Corrèze, les bénéficiaires des traitements de substitution sont plus nombreux entre 25 et 39 ans. Les 3 traitements disponibles sont prescrits aux patients. A noter la part importante du Subutex par rapport à son générique la Buprénorphine.


La politique de réduction des risques

VENTE DE STERIBOX

Vente de Stéribox en nombre de boîtes

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Evolution 2007/2008	Evolution 2002/2008
Corrèze	4 589	5 952	5 757	6 812	5 798	6 954	6 685	-3,9%	45,7%
Limousin	15 992	18 262	19 224	20 201	21 506	28 321	28 912	2,1%	80,8%
France	2 603 394	2 648 945	2 584 902	2 560 766	2 572 632	2 645 063	2 594 722	-1,9%	-0,3%

**Evolution des ventes de Stéribox pour 100 hab de 20 à 39 ans de 2002 à 2008
(en nombre de boîtes)**



Source : OFDT, ILIAD, 2009 (Indicateurs Locaux pour l'Information sur les Addictions)

Stéribox II® à partir d'octobre 99 : 2 seringues 1ml Beckton Dickinson, 1 flacons eau stérile, 1 tampon alcoolisé, 1 préservatif + message préventif ; 2 stericups (récipient + filtre stérile).

Dans le cadre de la politique de réduction des risques, des kits stériles d'injection (Stéribox) sont disponibles pour les usagers de drogues par voie intraveineuse. Depuis le début de l'enquête en 2002, les ventes de Stéribox se situent en dessous de la moyenne nationale, plaçant le département au 66^{ème} rang.

Conséquences socio-sanitaires liées à la consommation de produits psychoactifs

DECES LIES AU TABAC

Le tabac est directement à l'origine de bronchites obstructives chroniques et de certains cancers (poumon, voies aérodigestives supérieures (VADS), conjointement avec l'alcool, et la vessie).

Il favorise également un grand nombre de pathologies (maladie cardio-circulatoire, cancer de l'œsophage et du col utérin) et les fausses couches chez la femme enceinte. S'ajoutent à cela, les risques subis par les nourrissons nés de mères fumeuses.

C'est la 1^{ère} cause de décès évitables en France...

Décès avant 65 ans par tumeurs de la trachée, des bronches et des poumons par 10 000 habitants de 40 à 64 ans

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Corrèze	4,6	3,6	5,2	5,1	5,3	5,4	4	5,4	5,1	5,4
Limousin	4,3	3,9	5,7	5,6	5,2	5,5	5	4,6	5,5	8,8
France	5	5,3	5,3	5,2	5,2	5,4	5,4	5,4	5,7	5,6

Source : OFDT, ILIAD (Indicateurs Locaux pour l'Information sur les Addictions)

Les décès prématurés, directement imputables au tabac, demeurent élevés. En 2009 en Corrèze, 45 personnes de moins de 64 ans sont décédées à cause du tabac. Le département ne se singularise pas par rapport à la moyenne nationale, mais on peut noter qu'en 2008 le taux de décès pour la région a considérablement augmenté en raison du nombre important de décès en Creuse cette année là (104).

Conséquences socio-sanitaires liées à la consommation de produits psychoactifs

DECES LIES A L'ALCOOL

Alcool et pathologies associées...

« L'alcool est la deuxième cause de mortalité évitable en France. L'alcool contribue à **14 % des décès masculins** et à **3 % des décès féminins**. Chaque année, 23 000 décès sont directement attribués à l'alcool (18 000 hommes et 5 000 femmes). Il s'agit là de causes purement médicales concernant les cancers des voies aérodigestives (51 %), les cirrhoses hépatiques (38 %) et l'alcoolodépendance (11 %). Cette mortalité est maximale pour les 45-54 ans, puisqu'à cet âge, on estime qu'1 homme sur 5 et 1 femme sur 10 meure d'une maladie directement liée à la consommation excessive d'alcool. Mais ces chiffres ne tiennent pas compte des morts violentes et de certaines maladies mortelles dans lesquelles la consommation d'alcool a été incriminée comme cofacteur. » (Source : INPES).

Alcool et accidents de la route...

« La responsabilité de l'alcool dans les accidents de la circulation n'est pas facilement chiffrable, néanmoins le bilan annuel de la Sécurité routière (« L'accidentologie générale », bilan 2001) permet une évaluation portant sur une part des accidents mortels. Ainsi, sur les accidents étudiés, 31,2 % sont des accidents dans lesquels au moins un conducteur avait une alcoolémie positive. Et les 15-24 ans, qui représentent 13 % de la population générale, représentent 26,9 % des personnes tuées sur la route. On estime ainsi à **45 000 le nombre total de décès pour lesquels l'alcool agit comme facteur associé** (38 000 hommes et 7 000 femmes). » (Source : INPES).

Décès avant 65 ans par alcoolisme et cirrhose par 10 000 habitants de 40 à 64 ans

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Corrèze	3,6	3,8	2,4	2,4	3,2	4,8	3,9	4	4	3
Limousin	4,6	4,9	4,3	4,2	3,9	5,2	4,1	4	4,5	4,6
France	3,8	3,9	3,9	3,8	3,8	3,9	3,7	3,4	3,5	3,4

Source : OFDT, ILIAD (Indicateurs Locaux pour l'Information sur les Addictions)

Sont comptabilisés les décès avant 65 ans attribuables à l'alcool, hors cancers des voies aérodigestives : troubles mentaux et du comportement liés à la consommation d'alcool – cirrhose.

L'alcoolisme conduit à des pathologies graves et les décès sont nombreux. De 2004 à 2007, la Corrèze avait un taux de décès plus important que les tendances nationales.
En 2008, dans le département, 25 personnes sont décédées d'alcoolisme et de cirrhose.

Conséquences socio-sanitaires liées à la consommation de produits psychoactifs

ALCOOL ET ACCIDENTS DE LA ROUTE

**Evolution du nombre d'accidents corporels avec alcool
de 2003 à 2008**

	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Corrèze	18	19	19	25	32	29
Limousin	82	82	99	103	130	101
France	6 749	6 233	6 641	7 189	7 018	6 256

Source : OFDT, ILIAD (Indicateurs Locaux pour l'Information sur les Addictions)

Le nombre d'accidents corporels avec alcool regroupe à la fois les personnes gravement blessées ainsi que les personnes tuées lors d'un accident de la route.

Malgré tous les efforts aussi bien préventifs que répressifs, il s'avère que le nombre de blessés graves ou de personnes tuées dans un accident de la route où l'alcool est présent demeure élevé.

En Corrèze, les données sont particulièrement alarmantes puisqu'en 5 ans, le nombre d'accidents corporels avec alcool n'a cessé d'augmenter jusqu'en 2007. En 2008, on constate une légère baisse mais le nombre demeure cependant élevé.

La part des accidents corporels avec alcoolémie illégale dans l'ensemble des accidents corporels au taux d'alcoolémie connu, est en Corrèze de 10,5% (contre 10,2% au niveau national).

Lutte contre le trafic et infractions à la législation sur les stupéfiants

SAISIES DE PRODUITS STUPEFIANTS

Saisies par département et par produit de 2005 à 2009

	Cannabis*					évolution de 2008 à 2009
	2005	2006	2007	2008	2009	
Corrèze	2959	319 167	5644	4 349	9 391	116%
Limousin	59 487	334 479	16 575	24 733	234 794	849%
France	86 602 835	71 761 705	37 319 640	74 529 144	59 614 761	-20%

	Héroïne*					évolution de 2008 à 2009
	2005	2006	2007	2008	2009	
Corrèze	435	30	4	1 145	37	-97%
Limousin	789	170	154	9 755	155	-98%
France	748 798	1 051 507	1 035 915	1 117 772	970 297	-13%

	Cocaïne*					évolution de 2008 à 2009
	2005	2006	2007	2008	2009	
Corrèze	60	3	243	1 213	108	-91%
Limousin	505	30	533	4 297	436	-90%
France	5 185 992	10 166 323	6 578 593	8 214 619	5 211 841	-37%

	Ecstasy**					évolution de 2008 à 2009
	2005	2006	2007	2008	2009	
Corrèze	19	268	2	700	301	-57%
Limousin	36	1 045	5	3 826	438	-89%
France	833 648	1 488 919	1 359 912	342 923	106 597	-69%

Source : Rapports OCRTIS (données extraites BDD OSIRIS) 2005, 2006, 2007, 2008, 2009

* en grammes ; ** en comprimés

Les données sur les saisies sont difficilement interprétables. En effet, on constate qu'il y a de grosses disparités d'une année sur l'autre. Ceci s'explique par le fait que le nombre de saisies est étroitement lié aux activités des services de police, douanes et gendarmerie. Elles dépendent le plus souvent de démantèlement de réseaux de trafiquants suite à des enquêtes qui prennent du temps. Les saisies et les interpellations opérées en Corrèze et qui concernent un trafic plus vaste, ne sont pas nécessairement imputées aux services de ce département.

Cependant, les saisies les plus importantes que ce soit à l'échelle départementale, régionale ou nationale concernent la résine de cannabis, produit dont l'usage et le trafic sont les plus répandus en France.

En Corrèze, près de 9 kilos de cannabis, 108 grammes de cocaïne, 37 grammes d'héroïne et près de 300 cachets d'ecstasy ont été saisis en 2009.

Lutte contre le trafic et infractions à la législation sur les stupéfiants

INTERPELLATIONS POUR INFRACTIONS A LA LEGISLATION SUR LES PRODUITS STUPEFIANTS

Répartition des interpellations par type d'infractions et par département 2006/2009

	Trafic International				Trafic local			
	2006	2007	2008	2009	2006	2007	2008	2009
Corrèze	0	0	0	0	9	0	8	13
Limousin	0	1	0	3	20	18	43	46
France	1 516	1 651	1 686	1 700	5 777	8 198	8 265	8 132

	Usage revente				Usage simple			
	2006	2007	2008	2009	2006	2007	2008	2009
Corrèze	53	25	95	50	272	358	550	493
Limousin	133	97	181	151	629	750	1069	1057
France	9 376	11 548	17 875	11 986	93 817	112 923	147 927	137 594

	Total des interpellations			
	2006	2007	2008	2009
Corrèze	334	383	653	556
Limousin	782	866	1293	1257
France	110 486	134 320	175 753	159 412

Source : Rapports OCRTIS (données extraites BDD OSIRIS) 2005, 2006, 2007, 2008, 2009

En 2009 en Corrèze, l'usage simple représente près de 88,66 % des infractions à la législation sur les stupéfiants (contre 86,31 % à l'échelle nationale), viennent ensuite les interpellations pour usage et revente avec 8,99% (contre 7,5 % au niveau national).

Lutte contre le trafic et infractions à la législation sur les stupéfiants

INTERPELLATIONS POUR INFRACTIONS A LA LEGISLATION SUR LES PRODUITS STUPEFIANTS

Interpellations des trafiquants et des usagers-revendeurs par produit et par département 2006/2009

	Cannabis				Héroïne			
	2006	2007	2008	2009	2006	2007	2008	2009
Corrèze	55	23	89	50	0	0	9	5
Limousin	122	99	182	175	8	4	11	11
France	10 942	13 154	19 685	15 258	2 100	2 952	9 792	2 974

	Ecstasy				Cocaïne			
	2006	2007	2008	2009	2006	2007	2008	2009
Corrèze	5	0	1	4	0	0	4	3
Limousin	9	0	1	4	7	11	28	6
France	480	388	397	149	2 561	3 116	3 168	2 752

	Autres drogues			
	2006	2007	2008	2009
Corrèze	2	2	0	1
Limousin	7	2	2	4
France	586	1 787	784	685

	Total			
	2006	2007	2008	2009
Corrèze	62	25	103	63
Limousin	153	116	224	200
France	16 669	21 397	27 826	21 818

Source : Rapports OCRTIS (données extraites BDD OSIRIS) 2005, 2006, 2007, 2008, 2009

Les interpellations de trafiquants et d'usagers-revendeurs concernent majoritairement les infractions liées au cannabis (79,36% en 2009). Rappelons qu'il s'agit de la drogue la plus consommée et de ce fait, il existe de nombreux réseaux d'approvisionnement. Si l'un d'eux est démantelé, les autres récupèrent la part de marché ou de nouveaux se créent. Ce marché, très lucratif, est en constante évolution et de nombreux consommateurs n'hésitent pas à dealer pour se payer leurs produits.

Lutte contre le trafic et infractions à la législation sur les stupéfiants

INTERPELLATIONS POUR INFRACTIONS A LA LEGISLATION SUR LES PRODUITS STUPEFIANTS

Répartition des interpellations d'usagers par produit et par département 2006/2009

	Cannabis				Héroïne			
	2006	2007	2008	2009	2006	2007	2008	2009
Corrèze	263	349	528	468	4	2	8	1
Limousin	582	711	1 020	998	19	11	16	18
France	83 980	97 460	133 160	124 921	4 955	6 438	7 827	7 115

	Ecstasy				Cocaïne			
	2006	2007	2008	2009	2006	2007	2008	2009
Corrèze	2	0	1	5	1	2	7	5
Limousin	4	2	2	5	13	18	20	19
France	753	751	619	323	2 943	4 043	4 430	3 768

	Autres drogues			
	2006	2007	2008	2009
Corrèze	0	5	6	14
Limousin	5	8	11	17
France	1 186	4 231	1 891	1 467

	Total			
	2006	2007	2008	2009
Corrèze	272	358	550	493
Limousin	623	750	1 069	1 057
France	93 817	112 923	147 927	137 594

Source : Rapports OCRTIS (données extraites BDD OSIRIS) 2005, 2006, 2007, 2008, 2009

En 2009 en Corrèze, les interpellations d'usagers de cannabis représentent 94,92 % des interpellations liées aux ILS (contre 90,78 % à l'échelle nationale).
Entre 2006 et 2008, on observe une augmentation importante du nombre d'interpellations d'usagers de produits stupéfiants en Corrèze, comme au niveau national.



Rédaction et analyse
Clarisse GALINON
Chargée de mission

Agnès TALLET
Directrice

CIRDD Limousin

6, rue Ventenat – 87000 Limoges

05 55 33 61 07

Email : contact@cirddlimousin.fr

www.cirddlimousin.fr