

DROGUES : PLAISIRS. RISQUES. DÉPENDANCES.

MÉDICAMENTS

“Faut bien aller bosser”

Les médicaments psychotropes permettent de modifier l'état du psychisme. Tranquillisants, antidépresseurs, neuroleptiques et somnifères prescrits par les médecins à des personnes malades soignent notamment les états dépressifs, anxieux ou les insomnies.

Sans prescription, surdosés, ou en association avec l'usage contre-indiqué d'autres substances, ces médicaments ont des effets secondaires très importants.

Leur usage peut provoquer la baisse de la vigilance et des troubles de la mémoire. La surconsommation de médicaments tranquillisants, de certains antidouleurs et de somnifères installe le consommateur dans une dépendance qui reste souvent méconnue.

POUR EN SAVOIR PLUS : WWW.DROGUES.GOUV.FR

**EN CAS DE SITUATION D'URGENCE, COMPOSER LE 15 (LE SAMU) OU LE 18 (LES POMPIERS).
LE 112 À PARTIR D'UN PORTABLE.**

DRUGS : PLEASURES. RISKS. DEPENDENCES.

MÉDICAMENTS

“You have to go to work”

Psychotropic medications change the psychic state. Tranquillisers, antidepressants, neuroleptics and sleeping tablets prescribed by doctors for patients are used to treat depression, anxiety or insomnia.

Without prescription, overdosed or used in associations that are contra-indicated, these medications have significant secondary effects. Their use can lead to a loss of awareness and memory problems. Overuse of tranquilisers, some pain relief products and sleeping tablets can lead to a dependence that is often unrecognised.

DROGAS : PLACERES. RIESGOS. DEPENDENCIAS.

MÉDICAMENTOS

“Hace falta trabajar duro”

Los medicamentos psicotrópicos permiten modificar el estado del trastorno psíquico.

Los tranquilizantes, antidepresores, neurolepticos y somníferos prescritos por los médicos a las personas enfermas se centran sobre todo en los estados depresivos, ansiosos o los insomnios.

Sin prescripción, en sobredosis, o en asociación con el uso contraindicado de otras sustancias, estos medicamentos tienen efectos secundarios muy importantes. Su uso puede provocar una disminución de la atención y problemas de la memoria. El consumo excesivo de medicamentos tranquilizantes, de ciertos analgésicos y de somníferos instala al consumidor en una dependencia farmacéutica que muchas veces no es detectada.